

Observatieformulier bij "Eten en drinken bij dementie"

Algemene informatie	
Datum observatie / observant	
Naam / geboortedatum / afdeling	
Medische diagnose / nevendiagnose	
Hulpvraag	
Aanvullende informatie (vooraf invullen)	
Bewustzijn / conditie	
Gedrag / invloed van prikkels	
Omgangsadvis / instrueerbaarheid	
Status mond en gebit(sprothese)	
Gewichtsverloop	
Huidige consistenties	
Voorkeur voedsel / dranken	
Informatie m.b.t. eet- en drinksituatie	
Houding	
Zelfstandigheid / hulpmiddelen	
Observatiemoment (tijdstip en duur)	
Geobserveerde consistentie(s)	
Ruimte / omgevingsfactoren	
Opmerkingen	

Fase 1 Voorbereidende orale fase
voedselopname, voedsel kauwen, voedsel verzamelen tot bolus

- Geen of verminderde initiatiefname
- Apraxie
- Problemen met herkenning voedsel, dranken en/of eetgerei (agnosie)
- Afweergedrag bij eten en drinken (indien nodig invullen observatielijst afweergedrag)
- Primitieve reflexen (bijt/zuigreflex)
- Problemen met afhappen en/of lipsluiting
- Tongprotrusie
- Te grote/te kleine hap/slok
- Ontremd eten (proppen)
- Voedsel/vochtverlies uit de mond (rechts/links)
- Veel/weinig speeksel
- Niet/te kort/te lang kauwen
- Voedsel/drank lang in de mond houden
- Hamsteren
- Geen bolusvorming
- Opmerkingen

Fase 2 Orale transportfase
transport voedselbolus naar farynx

- Vertraagde of geen slikinzet
- Hoest voor slikinzet
- Moet regelmatig meerdere keren slikken (> 2 keer) voordat bolus is weggeslikt
- Voedselresidu in wangzak / onder- op de tong / tegen gehemelte/kaakrand (na slikken/of na maaltijd) li/re
- Opmerkingen

Fase 3 Faryngeale fase
slikreflex, velofaryngeale afsluiting, larynxheffing, larynxsluiting

- Geen slikreflex
- Onvolledige larynxheffing
- Verminderde krachtige slikbeweging
- Hoesten tijdens het slikken
- Hoesten direct na het slikken < 1 minuut
- Borreligestem na het slikken
- Nasale regurgitatie
- Vermoeden dat voedsel in de keel blijft hangen
- Vermoeden van pijn
- Opmerkingen

Fase 4 Oesofageale fase

Bij vermoeden van stoornissen in deze fase wordt arts ingeschakeld voor nader onderzoek

- Na een paar happen stoppen met eten
- Kokhalzen en/of overgeven tijdens/na maaltijd
- Hoesten enige tijd na het wegslikken > 3 minuten
- Reflux
- Boeren
- Vermoeden dat het voedsel niet zakt (ter hoogte van de slokdarm)
- Vermoeden van pijn
- Opmerkingen

Conclusie

Advies

Denk hierbij aan: de consistentie, houding, hulp, hulpmiddelen, omgeving, inschakelen andere disciplines etc.